

Seguimiento de evaluación Vanderbilt de NICHQ: informante de padres

Fecha de hoy: _____

Nombre del niño: _____

Fecha de nacimiento del niño: _____

Nombre del padre o la madre: _____

Número de teléfono del padre o la madre: _____

Instrucciones: Cada calificación debe tenerse en cuenta en el contexto de lo que resulta adecuado para la edad de su hijo. Piense en las conductas de su hijo desde que completó la última escala de evaluación cuando califique sus conductas. ¿Esta evaluación se basa en un tiempo en el que el niño

estaba medicado? no estaba medicado? no está seguro?

Si está tomando medicamentos, haga una lista de nombres y dosis de los medicamentos: _____

Síntomas	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
1. No presta atención a los detalles o comete errores de descuido con, por ejemplo, la tarea				
2. Tiene dificultad para prestar atención a lo que debe hacerse				
3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente				
4. No obedece cuando le dan instrucciones y no termina las actividades (no porque se niegue ni porque no entienda)				
5. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades				
6. Evita, le disgusta o no quiere comenzar tareas que requieren de un esfuerzo mental constante				
7. Pierde las cosas necesarias para las tareas o las actividades (juguetes, trabajos, lápices, libros)				
8. Se distrae fácilmente por ruidos u otros estímulos				
9. Es olvidadizo en las actividades cotidianas				
10. Juguetea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento				
11. Se levanta de su asiento cuando se espera que permanezca sentado	0	1	2	3
12. Corre por todas partes o escala demasiado cuando se espera que permanezca sentado				
13. Tiene dificultad para jugar o comenzar actividades de juegos tranquilos				
14. Con frecuencia no se detiene, o actúa como si estuviera "impulsado por un motor"				
15. Había demasiado				
16. Lanza las respuestas antes de haber terminado las preguntas				
17. Tiene dificultad para esperar su turno				
18. Interrumpe o se entromete en las conversaciones o actividades de los demás				

Para uso exclusivo del consultorio/
For Office Use Only _____/9

Para uso exclusivo del consultorio/
For Office Use Only _____/9



Seguimiento de evaluación Vanderbilt de NICHQ: informante de padres

Síntomas (continuación)	De vez			Muy a menudo
	Nunca	en cuando	A menudo	
19. Discute con los adultos				
20. Pierde la paciencia				
21. Desafía en forma activa o se niega a obedecer los pedidos o las reglas de los adultos				
22. Molesta a la gente deliberadamente				
23. Culpa a otros por sus errores o mala conducta				
24. Es sensible o se molesta fácilmente con los demás				
25. Se muestra enojado o resentido				
26. Es rencoroso y busca vengarse				

Para uso exclusivo del consultorio
For Office Use Only /8

Rendimiento	Por encima del promedio		Algo problemático	
	Excelente	Promedio	Problemático	Problemático
27. Lectura				
28. Escritura				
29. Matemática				
30. Relación con los padres				
31. Relación con los hermanos				
32. Relación con los compañeros				
33. Participación en actividades organizadas (p. ej. equipos)				

Para uso exclusivo del consultorio
For Office Use Only /3

Para uso exclusivo del consultorio
For Office Use Only /3

Para uso exclusivo del consultorio
For Office Use Only /4

Para uso exclusivo del consultorio
For Office Use Only /4

Adaptado de las Escalas de calificación Vanderbilt desarrolladas por el Dr. Mark L. Wolraich.

Efectos secundarios: ¿Ha sufrido su hijo alguno de los siguientes efectos secundarios? ¿Representaron un problema durante la semana pasada?	¿Son estos efectos secundarios un problema actualmente?			
	Ninguno	Leves	Moderados	Graves
Dolor de cabeza				
Dolor de estómago				
Cambio en el apetito—explique a continuación				
Problemas para dormir				
Irritabilidad a media mañana, a media tarde o por las noches—explique a continuación				
Socialmente retraído—disminución de interacción con los demás				
Tristeza extrema o llanto inusual				
Se muestra aburrido, cansado, apático				
Temblores				
Movimientos repetitivos, tics, espasmos, temblores musculares, parpadeo—explique a continuación				
Se rasca la piel o los dedos compulsivamente, se come las uñas, se muerde los labios o las mejillas—explique a continuación				
Ve o escucha cosas que no existen				

Explique/comente:

Adaptado de la escala de efectos secundarios Pittsburgh, desarrollada por William E. Pelham, Jr, PhD. Disponible para descargar gratuitamente en formato expandido en: <http://ccf.FIU.edu>.